

## **Инструкция по применению**

Биологически активная добавка к пище  
**«Имброфитол»**  
не является лекарственным средством

### **Состав**

Сухой стандартизованный экстракт корневища имбиря лекарственного - 50 мг, носитель: микрокристаллическая целлюлоза, стабилизатор: гидроксипропилметилцеллюлоза, антислеживающие агенты: кремния диоксид и тальк, краситель: титана диоксид, эмульгатор: магния стеарат, загуститель: глицерин, краситель: медные комплексы хлорофиллина.

### **Свойства Имброфитола**

Имброфитол оказывает противорвотное действие, стимулирует секрецию слюны, желудочного сока, желчи, нормализует пищеварение, облегчает проявление легких желудочно-кишечных расстройств, включая вздутие живота и метеоризм.

Обладает доказанным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Обладает антибактериальной активностью, подтвержденной *in vitro*.

Сухой стандартизованный экстракт корневища имбиря лекарственного, *Zingiber officinale*, входящий в состав продукта Имброфитол, является в 10 раз более концентрированным, чем обычный порошок имбиря (50 мг стандартизованного экстракта корневища имбиря лекарственного эквивалентны 500 мг порошка корня имбиря).

### **Область применения**

В качестве биологически активной добавки к пище – источника полифенольных соединений, содержащей гингерол, – используется для:

- Предотвращения укачивания в транспорте (тошнота, рвота, головокружение);
- Облегчения состояния при незначительных расстройствах пищеварения, в том числе диспепсии, ощущении переполненности желудка, метеоризме, тошноте и рвоте, а также при временной потере аппетита;
- Предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией (в качестве вспомогательного средства);
- Предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты (необходимо принять как минимум за 1-2 часа до операционного вмешательства).

### **Способ употребления**

**Имброфитол** рекомендован для применения взрослым и детям старше 14 лет.

Принимать по 2 таблетки 3-4 раза в день независимо от приема пищи.

Продолжительность приема – 1 неделя. При необходимости приём можно повторить.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Из-за риска кровотечения продукт следует применять с осторожностью пациентам, принимающим антикоагулянты или антиагреганты.

### **Форма выпуска**

Таблетки в оболочке, расфасованные по 18 штук в блистере, по 2 блистера в упаковке.

**Срок годности**

3 года со дня выпуска.

**Условия хранения**

В сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

**Условия реализации**

В соответствии с национальным законодательством государств-членов Евразийского Экономического Союза.

**Свидетельство о государственной регистрации**

№ RU.77.99.11.003.E.004803.11.17 от 10.11.2017 г.

**Изготовитель:** компания «Tilman SA-NV», Бельгия (Zone d'Activites Sud, 15, 5377 Baillonville) для компании «Laboratoires MAYOLY SPINDLER», Франция (6, avenue de l'Europe, 78400, CHATOU).

**Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя**

**в Российской Федерации:**

ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27

Телефон: +7 (495) 664-83-03

e-mail: phv@mayoly-spindler.ru

**в Республике Казахстан:**

ТОО «Майоли Казахстан»

ул. Байзакова 125/185, нежилое помещение 1

050026, Алматы, Республика Казахстан

тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44

e-mail: office@mayoly.kz

